

ЛОНГИДАЗА®

в лечении послеожоговых рубцов

КОНЬЮГАТ ВЫСОКООЧИЩЕННОГО ФЕРМЕНТА ГИАЛУРОНИДАЗЫ С СОПОЛИМЕРОМ N-ОКСИДА 1,4-ЭТИЛЕНПИПЕРАЗИНА И (N-КАРБОКСИМЕТИЛ)-1,4-ЭТИЛЕНПИПЕРАЗИНИЙ БРОМИДА

Полифункциональный ферментный препарат для лечения заболеваний, сопровождающихся гиперплазией соединительной ткани

**В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ**



Формы выпуска препарата Лонгидаза®: суппозитории 3000 ME; лиофилизат 3000 ME для приготовления раствора для инъекций

Оптимальная схема лечения:

ЛОНГИДАЗА® 3000 ME лиофилизат 1 инъекция в 5 дней, курс 10 - 15 инъекций

«Лонгидаза» — препарат выбора для комплексного консервативного лечения последствий ожогов.

- Лонгидаза при инъекциях в рубец рассасывает фиброзную ткань, происходит сглаживание рубца и замещение «зрелой» соединительной тканью на месте рубца.
- Лонгидаза устраняет неприятные ощущения у пациентов: зуд, жжение, боль, стянутость кожи.
- Лонгидаза повышает «качество жизни» пациентов с патологическими рубцами.
- Лонгидаза эффективна при ранних и при длительно существующих рубцах.
- Лонгидаза может применяться длительное время без развития побочных эффектов

Научные работы

1. Лонгидаза в комбинированной терапии рубцовых поражений кожи. Стенько, Коновалова. Ж: Вестник Эстетической Медицины № 1, 2012.
2. Современный взгляд на комплексную терапию патологических рубцовых образований. Круглова Л. С., Стенько А. Г., Течиева С. Г., Шматова А. А.. «Вестник дерматологии и венерологии». 2014 г.
3. Применение ферментов при лечении рубцов кожи. Парамонов, Турковский, Антонов. Ж: Искусство профессионалов красоты № 11, 2012.

Наилучшие результаты и сокращение сроков реабилитации больных с послеожоговыми рубцовыми контрактурами суставов конечностей достигаются при комбинации хирургического и консервативного лечения рубцов.

Давность рубцов	Режим назначения «Лонгидазы» лиофилизат 3000 ME
Свежие рубцы (от 2 нед. до 1 года)	Ультрафонофорез: На лице – 0,2 Вт\см. На др участках тела – 0,4 – 0,8 Вт\см 15 минут, ежедневно или через день, на курс – 20 процедур. Или в\м инъекции 1 раз в 5 дней, курс 10 инъекций.
Старые рубцы (более 1 года)	Чередование внутрирубцового и подкожного вблизи места поражения введения «Лонгидазы» (2 раза в неделю) или ультразвукофореза и в\м инъекций 1 раз в неделю, курс 4 недели

При необходимости рекомендуется повторный курс не ранее, чем через 2–3 месяца.

Информация для медицинских работников

Имеются противопоказания. Перед назначением препарата ознакомьтесь с инструкцией